



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

КУРСОВА РАБОТА

ПО МЕЖДУНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

НА ТЕМА:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЦИОНАЛНОСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА УПОТРЕБА

Изготвил:

Проверил:

София, 2016

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД.....	3
1. Показатели	5
2. Предписващи индикатори.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	9
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.....	10

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЕ:

СЗО - Световна Здравна Организация

АТС - Анатомио терапевтично химичната класификация

ДДД - Дефинирана дневна доза

INRUD - Международната мрежа за рационално използване на лекарствата

УВОД

Рационалното използване на лекарства изисква „пациентите да получават лекарства, подходящи за техните клинични нужди, в дози, които отговарят на техните собствени индивидуални изисквания за достатъчен период от време, на най-ниската цена за тях и тяхната общност”¹. Нерационалното използване на лекарствата е проблем и за да го разреши през 1985г. Световната здравна организация (СЗО) е свикала международна конференция в Найроби, Кения².

Есенциалните (основни) лекарства са един от инструментите за борба с влошеното здраве. Чрез увеличаване на достъпа до основни лекарства и тяхното рационално използване, би могло да се подобри здравния статус и да се осигурят ползи за в бъдеще³. „Основните лекарства са тези, които отговарят на нуждите от здравеопазване на по-голямата част от населението; Ето защо те трябва да бъдат на разположение по всяко време, в достатъчни количества и в подходящи дозирани форми”⁴. Тази концепция е въведена, за да се ускорят положителните въздействия на лекарствата върху здравното състояние, особено в развиващите се страни⁵.

В световен мащаб, повече от половината от всички лекарства са предписани, или продадени неправомерно, и 50% от пациентите не успяват да ги приемат правилно. Освен това, около една трета от населението на света няма достъп до основни лекарства⁶.

¹ WHO: *The Rational Use of Drugs. Report of a conference of experts, Nairobi, 25–29 November 1985*. Geneva: World Health Organization; 1987.

² Пак там

³ WHO: *WHO Medicines Strategy: Framework for action Essential drugs and Medicines policy 2000–2003*. Geneva: WHO; 2000. (WHO/EDM/2000.1);

⁴ WHO: *The use of Essential Drugs. 6th Report of the Expert Committee*. Geneva: WHO Technical Report Series 850.3; 1995. Accessed at <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jwhozip13e/>

⁵ Hogerzeil HV, Walker GJA, Sallami AO, Fernando G: **Impact of an essential drugs program on availability and rational use of drugs**. *Lancet* 1989, **1**(8630) 141–142.

⁶ WHO: *World Health Organization promoting rational use of medicines: core components. WHO Policy and Perspectives on medicine no. 5 Document WHO/EDM/2002.3*. Geneva: WHO; 2002.